

Erkrankungen des Pankreas
Erklärungshilfe für Ihre Patientengespräche



Sehr geehrte Ärztin, sehr geehrter Arzt,

der vorliegende Block soll Sie bei der Aufklärung Ihrer Patienten unterstützen. Da Pankreaserkrankungen selten und somit wenig bekannt sind, ist es oft schwierig, betroffenen Patienten die Anatomie der Bauchspeicheldrüse und die komplexen Lagebeziehungen zu den umliegenden Organen verständlich zu machen.

Egal, ob Sie die Lage einer Pankreaszyste und mögliche endoskopische Zugangswege erklären wollen oder das Ausmaß einer Operation veranschaulichen möchten, mit unseren Illustrationen ist dies leicht verständlich darzustellen. Auch häufigere Erkrankungen wie die Cholezysto- oder Choledocholithiasis sowie die korrespondierenden endoskopischen und operativen Therapiemöglichkeiten können bildlich und einfach demonstriert werden.

Häufig sind den Patienten Ihre Erklärungen nach dem Verlassen des Behandlungszimmers nicht mehr ausreichend präsent. Durch das Mitgeben der Abbildungen können sich Ihre Patienten die Erläuterungen erneut vor Augen führen und auch Angehörigen erklären.

Nutzen Sie die Illustrationen unserer Erklärungshilfe, die wir in Zusammenarbeit mit dem Gastroenterologen und Pankreasexperten PD Dr. med. Veit Phillip an der Technischen Universität München überarbeitet haben. Ihre Patienten werden es Ihnen danken.

**Viel Erfolg wünscht Ihnen
Ihre Nordmark Pharma GmbH**





Nordmarks Pankreatin-Sortiment

Mikrofilmtabletten

Pankreatan® **10.000**

Pankreatan® **20.000 Ph.Eur.-Einheiten**

Pankreatan® **25.000**

Pankreatan® **36.000**

Pellets

Pankreatan® **40.000 Ph.Eur.-Einheiten**

Normgröße	Anzahl
N1	50 Kapseln
N2	100 Kapseln
N3	200 Kapseln
N1	50 Kapseln
N2	100 Kapseln
N3	200 Kapseln
N1	50 Kapseln
N2	100 Kapseln
N3	200 Kapseln
N1	50 Kapseln
N2	100 Kapseln
N3	200 Kapseln

Dosierungsempfehlung

Empfohlener Richtwert: 2.000 Ph.Eur.-Einheiten Lipase pro g Nahrungsfett.

Die Einnahme erfolgt direkt zu jeder Mahlzeit, unzerkaut je nach Bedarf.

Einstiegsdosierung:

25.000 - 80.000 Ph.Eur.-Einheiten pro Hauptmahlzeit¹

10.000 - 40.000 Ph.Eur.-Einheiten pro Zwischenmahlzeit¹

Der Therapieerfolg sollte nach ca. 4-6 Wochen anhand der Symptome und klinischer Parameter überprüft und die Dosis ggf. angepasst werden.

1) Fachinformation Pankreatan 25.000, Stand 02/2021

Bestellen Sie jetzt **kostenlos** auf unserer Website



Block
„Erklärungshilfe für
Ihre Patientengespräche“



Patienten-Information
„Ernährungstagebuch“



Patienten-Information
„Behandlung mit Pankreasenzymen“



Service für Fachkreise
„Erstattungsfähigkeit“



Patienten-Information
„So dosieren Sie Pankreasenzyme“



Hier geht es direkt
zum Bestellformular

> Weitere Informationen zu Erkrankungen des Pankreas und der Behandlung einer exokrinen Pankreasinsuffizienz finden Sie im Fachkreisbereich auf unserer Website.

Nutzen Sie unseren **Service**



Per Telefon:
04122 712-777



Per E-Mail:
info@pankreatan.de



Per Post:
Nordmark Pharma GmbH
Pinnallee 4
25436 Uetersen



Online:
www.pankreatan.de



• **Service & Tipps**
• **Leckere Rezepte**


Nordmark Pharma GmbH
Pinnallee 4 | 25436 Uetersen

www.nordmark-pharma.de
www.pankreatan.de




Pankreatan® 10.000 / 25.000 / 36.000 / Pankreatan® 20.000 / 40.000 Ph.Eur.-Einheiten **Wirkst.:** Pankreas-Pulver vom Schwein. **Zusammens.:** Pankreatan 10.000 / 20.000 / 25.000 / 36.000 / 40.000 – 1 magensaftresistente Hartkapsel enthält 97,6 / 195,2 / 244 / 303,5 / 319,05–414,35 mg Pankreas-Pulver vom Schwein (Lipaseaktivität 10.000 / 20.000 / 25.000 / 36.000 / 40.000 Ph.Eur.-Einh., Amylaseaktivität mind. 7.500 / 15.000 / 18.750 / 22.000 / 25.000 Ph.Eur.-Einh., Proteaseaktivität mind. 450 / 900 / 1.125 / 1.200 / 1.500 Ph.Eur.-Einh.). **Sonst. Bestandt.:** Pankreatan 10.000 / 20.000 / 25.000 / 36.000 – Crospovidon, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) Dispersion 30 % (Ph.Eur.), Polysorbat 80, Wasser, Triethylcitrat, Talkum, Simeticon Emulsion (Simeticon / Methylcellulose / Sorbinsäure (Ph.Eur.) / Wasser), Montanglycolwachs, Gelatine, Titandioxid (E171), Eisenoxide und -hydroxide (E172) [Eisenoxide nicht in Pankreatan 20.000], Natriumdodecylsulfat. Pankreatan 40.000 – Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) Dispersion 30% (Ph.Eur.), Polysorbat 80, Wasser, Triethylcitrat, Talkum, Simeticon Emulsion (Simeticon / Methylcellulose / Sorbinsäure (Ph.Eur.) / Wasser), Gelatine, Titandioxid (E171), Eisenoxide und -hydroxide (E172), Natriumdodecylsulfat. **Anw.:** Störungen der exokrinen Pankreasfunktion, die mit einer Maldigestion einhergehen. Bei Kindern, Jugendlichen u. Erwachsenen. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenw.:** Sehr häufig: Bauchschmerzen. Häufig: Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Diarrhoe, Völlegefühl/Blähungen. Gelegentlich: Ausschlag. Häufigkeit n. bekannt: Strikturen der Ileoözalregion und des Dickdarms (fibrosierende Kolonopathie), Pruritus, Urtikaria, Überempfindlichkeit, anaphylaktische Reaktionen. Weitere Hinweise siehe Fachinformation. **Stand:** März 2023. Nordix Pharma Vertrieb GmbH, Pinnallee 4, 25436 Uetersen. Ein Unternehmen der Nordmark-Gruppe.

Verdauungsorgane



Bauchspeicheldrüse (Pankreas)



Praxisstempel