

Nordmarks Pankreatin-Sortiment

Pankreatan® **10.000 / 25.000 / 36.000**


Pankreatan® **20.000 / 40.000 Ph.Eur.-Einheiten**

Leitlinienkonforme Therapie¹ bei Störungen der exokrinen Pankreasfunktion,

die mit einer Maldigestion einhergehen, wie z. B.:

- **Chronische Pankreatitis**
- **Pankreasresektion**
- **Mukoviszidose**
- **Z. n. Gastrektomie**

Zur Behandlung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen.



Höchste verfügbare Einzeldosis • Umfassendes Sortiment • Voll lieferfähig • Erstattungsfähig²

1. Beyer G, et al. Z Gastroenterol. 2022;60:419-521

2. Arzneimittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, Anlage I: Zugelassene Ausnahmen zum gesetzlichen Verordnungsausschuss nach § 34 Abs. 1 Satz 2 SBG V (OTC-Übersicht). In Kraft getreten am 15. April 2021

3. Keller J, Layer P. Pharmakon. 2019;7:422-427

4. Fachinformation Pankreatan® 10.000 / 25.000 / 36.000 / Pankreatan® 20.000 Ph.Eur.-Einheiten Stand Februar 2021 / Pankreatan® 40.000 Ph.Eur.-Einheiten Stand März 2023

Die Veröffentlichungen 1-3 beziehen sich nicht namentlich auf die hier beworbenen Arzneimittel.

Dosierempfehlung

Empfohlener Richtwert:

2.000 Ph.Eur.-Einheiten Lipase pro g Nahrungsfett.³

Das entspricht ca. 25.000 - 80.000 Lipase-Einheiten für eine Hauptmahlzeit und ca. 10.000 - 40.000 Lipase-Einheiten für eine Zwischenmahlzeit.⁴

Die Einnahme der Kapseln erfolgt direkt zu jeder Mahlzeit unzerkaut, je nach Bedarf.

- Die Dosierung richtet sich nach dem Schweregrad des Enzymmangels und dem Fettgehalt der Nahrung.
- Im Einzelfall kann die benötigte Enzymmenge über oder unter dem Richtwert liegen.

Nordmark Pharma GmbH
Pinnallee 4 | 25436 Uetersen

www.nordmark-pharma.de
www.pankreatan.de



Weitere
Informationen
gleich hier:
www.pankreatan.de



Pankreatan® 10.000 / 25.000 / 36.000 / Pankreatan® 20.000 / 40.000 Ph.Eur.-Einheiten Wirkst.: Pankreas-Pulver vom Schwein. **Zusammens.:** Pankreatan 10.000 / 20.000 / 25.000 / 36.000 / 40.000 – 1 magensaftresistente Hartkapsel enthält 97,6 / 195,2 / 244 / 303,5 / 319,05–414,35 mg Pankreas-Pulver vom Schwein (Lipaseaktivität 10.000 / 20.000 / 25.000 / 36.000 / 40.000 Ph.Eur.-Einh., Amylaseaktivität mind. 7.500 / 15.000 / 18.750 / 22.000 / 25.000 Ph.Eur.-Einh., Proteaseaktivität mind. 450 / 900 / 1.125 / 1.200 / 1.500 Ph.Eur.-Einh.). **Sonst. Bestandt.:** Pankreatan 10.000 / 20.000 / 25.000 / 36.000 – Crospovidon, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) Dispersion 30 % (Ph.Eur.), Polysorbat 80, Wasser, Triethylcitrat, Talkum, Simeticon Emulsion (Simeticon / Methylcellulose / Sorbinsäure (Ph.Eur.) / Wasser), Montlanglycolwachs, Gelatine, Titandioxid (E171), Eisenoxide und -hydroxide (E172) [Eisenoxide nicht in Pankreatan 20.000], Natriumdodecylsulfat. Pankreatan 40.000 – Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) Dispersion 30% (Ph.Eur.), Polysorbat 80, Wasser, Triethylcitrat, Talkum, Simeticon Emulsion (Simeticon / Methylcellulose / Sorbinsäure (Ph.Eur.) / Wasser), Gelatine, Titandioxid (E171), Eisenoxide und -hydroxide (E172), Natriumdodecylsulfat. **Anw.:** Störungen der exokrinen Pankreasfunktion, die mit einer Malignation einhergehen. Bei Kindern, Jugendlichen u. Erwachsenen. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenw.:** Sehr häufig: Bauchschmerzen. Häufig: Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Diarrhoe, Völlegefühl/Blähungen. Gelegentlich: Ausschlag. Häufigkeit n. bekannt: Strikturen der Ileozökalgion und des Dickdarms (fibrosierende Kolonopathie), Pruritus, Urtikaria, Überempfindlichkeit, anaphylaktische Reaktionen. Weitere Hinweise siehe Fachinformation. **Stand:** März 2023. Nordix Pharma Vertrieb GmbH, Pinnallee 4, 25436 Uetersen. Ein Unternehmen der Nordmark-Gruppe.